



Kaiser-Wilhelm-Ring 43 a
40545 Düsseldorf

Fon 0211.55 02 87 80
Fax 0211.55 02 87 89

info@klinikamrhein.de
www.klinikamrhein.de



Faltenunterspritzung



Klinik am Rhein
Fachklinik für Plastische Chirurgie

Faltenunterspritzung

Wir unterscheiden heute drei Arten von Faltenunterspritzungen:

1. Botulinum

Diese Behandlung dient zur Glättung der s.g. mimischen Falten, welche durch eine zu hohe Muskelspannung verursacht werden. Typischerweise sind dies die Zornesfalten, die horizontalen Stirnfalten und die Lachfalten. Weitere Behandlungszonen sind aber auch die Mundwinkel- und Kinnfalten. Die Möglichkeit die Muskelspannung gezielt zu erniedrigen steht uns schon seit über 20 Jahren zur Verfügung. Dabei werden kleinste Mengen der Substanz durch hauchfeine Kanülen an bestimmten Stellen in die Haut injiziert. Die Wirkung setzt nach 2-3 Tagen ein und hat sich nach zwei Wochen voll entfaltet. In der Regel hält der Effekt 6 Monate an.



Mehr Informationen finden Sie unter: www.klinikamrhein.de

2. Hyaluron als Füllmaterial

Durch den Verlust von Elastizität und Volumen entstehen typischerweise die s.g. Nasolabialfalte, die Mundwinkelfalte, die Lippenfältchen und die Wangenfalten. Hier kommt Hyaluron als s.g. Füllmaterial zum Einsatz. Die Falten werden dabei in einem bestimmten Hautniveau mit der Hyaluron direkt unterfüttert, was zu einem sofort sichtbaren Effekt führt. Das gleiche Vorgehen wird auch zur Betonung des Lippenvolumens bzw. zur Verbesserung der Lippenform eingesetzt. Die modernen, synthetisch hergestellten Hyaluron werden mit feinen Kanülen eingebracht. Ihre Wirkdauer ist abhängig von der gewählten Gelkonsistenz (abhängig von der Faltenart und -tiefe) und liegt zwischen 6 und 18 Monaten.

3. Hyaluron als Volumengeber

Die dritte Behandlungsgruppe dient der Verbesserung der Proportionen im Gesicht – mittels volumengebender Hyaluron. Dank neuer Produkte ist die Zahl dieser Behandlungen in letzter Zeit rasant angestiegen. Durch spezielle gewebeschonende Kanülen lässt sich gerade diese Art der Behandlung heutzutage nahezu ohne Schwellungen oder blaue Flecken durchführen. Typische Behandlungszonen sind das Mittelgesicht, die Jochbeinregion, die Wangen und das Kinn. Die Wirkdauer dieser speziellen Hyalurongruppe ist aufgrund der höheren Konsistenz deutlich länger und liegt bei etwa 24 Monaten.

Auf einen Blick

OP-Dauer	15-30 Min.	Narkose	Betäubungsalbe
Aufenthalt	1 Stunde	Schonzeit	1 Tag